Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

MEHmed MEDITERRANEAN ENVIRONMENTAL CHANGE MANAGEMENT MASTER STUDY & ECOSYSTEM BUILDING

Les bases scientifiques des changements environnementaux en méditerranée.

Coordinator

méditerranée.

Partners

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

info@mastermehmed.com
www.mastermehmed.com

PROJECT NUMBER: 598826-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

صالح بونيدر
SALAH BOUBNIDER

MASTER STUDY & ECOSYSTEM BUILDING

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Conférence dans le cycle des « Jeudi de l'environnement » du Master
MEHmed Mediterranean Environmental Change Management

Changement climatique Du Paléoclimat au Climat d'aujourd'hui

Chapitre I & II

Dr Farès KESSASRA

Associate Professor
Jijel University (Algeria)

Constantine, 18 Février 2021

Coordinator

Partners

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

info@mastermehmed.com
www.mastermehmed.com

PROJECT NUMBER: 598826-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Maître de conférences HDR, Département des Sciences de la Terre et de l'Univers, Université de Jijel

Maître de recherches et chef d'équipe au Laboratoire de Génie Géologique, **LGG**, Université de Jijel

Consultant, International Hydrological Program UNESCO, Paris, 2004-2008

Ph.D. Hydrogeology, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB-Alger) et UPMC-Paris VI

Ph.D student, Profas B scholarship, Université Pierre et Marie Curie (UPMC-Paris VI), 2010

Master 2 Hydrologie Hydrogéologie, Université Pierre et Marie Curie (UPMC-Paris VI), 2004-2005

Magistère Hydrogeology, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB-Alger), 2002-2006

CHAPITRE 1. CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL, CAUSES ET PREUVES

- Limites de la croissance (du Club de Rome au paradigme de la durabilité)
- Croissance exponentielle du développement durable
- L'anthropocène
- Limites planétaires

CHAPITRE 2. PALEOCLIMATIQUE

- Échelles climatiques et paléoclimatiques
 - Variabilité et changement climatique
 - Époques géologiques et climat
 - Glaciations et périodes interglaciaires
 - Climat de l'Holocène
-

52 % de la population mondiale pourrait avoir les effets d'une pénurie d'eau d'ici 2050, ONU, 2020

4 milliards d'individus affrontent une pénurie sévère pendant un mois par an.

« Les effets du changement climatique peuvent être observés au Moyen-Orient par des hivers plus secs et des étés plus chauds », Doron Markel, scientifique israélien

"97% des ressources d'eau sont dans des nappes transfrontalières, d'où la nécessité d'une gestion efficace ", Benedito Braga, président du Conseil mondial de l'eau

Science

\$15
17 APRIL 2020
SPECIAL ISSUE
sciencemag.org

AAAS

DROUGHT

Si le réchauffement climatique continue sans faiblir, la Terre pourrait bien connaître une vague d'extinction d'espèces plus haute que prévu. *Conservation Biology*, **Lee Hannah et al, 2007**

Si le taux de CO₂ atteindra le double de sa valeur actuelle, le modèle prévoit la disparition de **56.000 espèces de plantes** et de **3.700 espèces de vertébrés...**

Tout ce que l'on sait sur le climat vient d'abord de la science. Ils sont donc au cœur de la machine et bien placés pour savoir qu'on a besoin de citoyens formés pour engager les transformations nécessaires.» **Valérie Masson-Delmotte**, paléoclimatologue

Créé en 1968 à l'initiative de l'industriel Aurelio Peccei et du directeur des affaires scientifiques de l'OCDE, Alexander King, groupe d'experts.

Son étude visant à simuler le fonctionnement du système planétaire.

Résultats:

- population croissante avec des besoins énergétiques en expansion
- pression sur l'environnement jusqu'à l'effondrement de la dynamique du système.

le **Club de Rome** prône un autre scénario (croissance zéro, redistribution des richesses ...etc.)

Limites de la croissance

The Limits to Growth

La décroissance

Le retour de la thèse de l'état stationnaire de John Stuart Mill

Concept physique qui correspond à une constance du stock de capital physique et de la population.

Ces quantités maintenues constantes à travers le temps. Cela doit conduire à allonger la durée de vie des individus et des biens (recyclage).

La décroissance

« la croissance actuelle doit non seulement cesser, mais être inversée »

Les limites matérielles et énergétiques conduisent à un « **programme bioéconomique minimal** » faire durer le stock d'énergie pour l'humanité.

XIX siècle: H_2O , CO_2 , CH_4 retiennent la chaleur dans l'atmosphère

1950 : les scientifiques inquiets de la hausse du CO_2 (énergies fossiles)

1958 : la courbe de Keeling, station sur un volcan à Hawaï, CO_2 augmente

1974 : deux chimistes anglais démontraient que les CFC détruisent l'Ozone, Prix Nobel en 1995

1750-2007 : augmentation concentration CO_2 de 37% (280 à 385 ppm)

1970-2004 : Augmentation des GES de 20 milliards de tonnes, total de 50 milliards de tonnes d'équivalent de CO_2

2001 : IPCC variation rapide du climat corrélée avec les GES. scénarios indiquant un réchauffement de 1 à 5 °C d'ici un siècle

Prise de conscience océanologues, glaciologues, climatologues, les géologues savent que le climat a connu de brusques changements. La terre a gardé des enregistrements des températures sur des dizaines de MA

1972 Conférence des Nations Unies, Stockholm, objectif « élaborer une politique commune afin de créer un ordre viable »

La déclaration s'interroge sur les « limites internes » (besoins humains) et les « limites externes » (ressources physiques de la planète)

« Nous croyons à la possibilité d'établir des modes de vie et des systèmes nouveaux plus justes, moins arrogants dans leurs exigences matérielles, plus respectueux de l'environnement de la planète entière. »

1979 Conférence mondiale sur la climat « prévoir et prévenir les changements climatiques d'origine anthropique qui pourraient nuire à l'humanité »

1987 Protocole de Montréal: protection de la couche d'Ozone

1992 Sommet de la terre, Rio de Janeiro
Convention cadre des NU sur les changements climatiques

1997 Conférence de Kyoto
Accord sur le climat en négociation : contraindre les émissions de GES

2005 Protocole de Kyoto rentre en vigueur
Diminution des rejets de CO₂, de CH₄ et autres GES

2015 Accord de Paris sur le Climat

Les activités humaines génèrent des rejets de **gaz à effet de serre** dans l'atmosphère, responsables de l'augmentation de température

Ere industrielle

Explosion
démographique

GES absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre et réémettent une partie de ce rayonnement vers la surface, la réchauffant

Vapeur d'eau (H_2O), 72 % de l'effet de serre naturel
Le RC accentue l'évaporation de l'eau, assèche les terres, accroît l'effet de serre et le réchauffement des océans

CO_2 : combustion des hydrocarbures, fabrication des molécules synthétiques, élevage intensif et fertilisation des sols, des halocarbures et de l'ozone atmosphérique (transports), et le carbone organique

CH_4 le méthane, 23 fois plus puissant. la fonte du pergélisol qui renferme des hydrates (glace de méthane) emprisonnée (130 à 2000 m). CH_4 libéré pourrait s'échapper et gagner l'atmosphère. sa durée de vie dans l'atmosphère : 12 ans et en présence d'oxygène, une partie se transforme en CO_2 et H_2O .

protoxyde d'azote (N_2O) ; ozone troposphérique (O_3), hydrochlorofluorocarbures, comme le HCFC-22 ; chlorofluorocarbures (CFC) ; hydrofluorocarbures (HFC) ; tétrafluorométhane (CF_4) ; hexafluorure de soufre (SF_6) pentafluorure de soufre trifluorométhyle (CF_3-SF_5).

7 polluants réglementés : SO_2 , CO , NO_2 , O_3 , PM_{10} , C_6H_6 , Pb

Recul des glaciers, glacier McCarthy (Alaska)
une fonte accélérée depuis plus de 5 ans. La banquise de l'Arctique qui a perdu une surface de 0,7million de km2 entre 1980 et 2000.

Hausse du niveau des mers, engloutissant des îles de faible altitude: Maldives, mais aussi Pays-bas, Bangladesh, Afrique de l'Ouest, ...etc.

Sécheresse, inondation, combinant température et pluviométrie : Affaiblissement de la mousson africaine , pluies torrentielles en Grande-Bretagne, canicule dans les pays de l'Est et mousson violente en Asie.

Pénurie d'eau, déclin de la biodiversité, pandémie, glissements de terrain, tsunamis, avalanches,

Pour limiter les dégâts du réchauffement climatique, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, *Thomas Stocker, Professeur, Université de Berne (Suisse), membre du GIEC*

D'autres solutions?

période géologique qui se serait ouverte à l'époque de la révolution industrielle, l'être humain est devenu une « **force géologique** » de par les changements climatiques et environnementaux qu'il produit.

L'anthropocène pose donc des questions :

- Qu'est ce que la nature, l'environnement, le milieu ?
- Quelles questions sociales sont posées par les changements environnementaux globaux?
- Les changements climatiques ne sont pas seulement un enjeu scientifique, du partage de ressources (l'eau, l'air, l'énergie, les métaux, les productions agricoles...).

Les géologues: les phases de réchauffement duraient environ 10 000 ans et étaient plus courtes que les périodes glaciaires (80 000 ans) mais l'effet anthropique a bouleversé la tendance

L'humanité est devenue une véritable force géologique, capable de retarder l'ère glaciaire et de conduire à une autre grande extinction dans les 300 à 600 ans à venir.

Dipesh Chakrabarty, University of Chicago, New Delhi, India

Limites planétaires

10 LP à ne pas dépasser pour maintenir les équilibres du système-Terre. *Johan Rockström, scientifique suédois*

Une limite correspond au seuil critique, la biosphère s'expose au risque d'un effondrement global.

Le franchissement d'une limite marque donc l'entrée dans une zone d'incertitude, qui renvoie au risque que la société est prête à prendre.

Biosphère, atmosphère, lithosphère, hydrosphère

Planetary Boundaries

after Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre et al. 2009

AVONS-NOUS DÉPASSÉ LA LIMITE ?

La limite planétaire est le seuil critique au-delà duquel les conséquences de la perturbation du cycle de l'eau sont incontrôlables. Si elle est franchie, la biosphère (c'est-à-dire l'ensemble du vivant) s'expose au risque d'un effondrement global.

La perturbation du cycle de l'eau est mesurée par la **quantité d'eau douce prélevée par l'Homme**.

Unité de mesure : Volume total annuel d'eau douce prélevée dans les eaux de surface et les eaux souterraines renouvelables, exprimé en km³/an.

Paléoclimat : échelle géologique

Le climat de la Terre a fortement varié depuis sa formation

Âges numériques (Ma) d'après G.S. Odin
Couleurs des différentes unités
d'après les données de la CCGM
Mai 2002

1/4 des terres émergées couvertes de glace : inlandsis (Groenland), et glaciers de vallées (Alpes)

Le niveau des océans baissé de 120 m

20 glaciations succédées; Traces du Riss et du Würm (10 000 ans), observables dans le massif Alpin

l'épaisseur de glace atteignait 2500 m

Le niveau de la mer avait baissé de 100 m

Chaque glaciation (tout les 100 000 ans), bouleversa la vie sur Terre (faune, flore, hommes, environnement).

S'adapter ou disparaître

une glaciation, c'est 5°C de moins mais depuis un siècle et demi la température a augmenté de 10 %.

Glacier du Rhône (Suisse)

Précambrien, au delà 540 millions d'années, peu de chose, terre assez chaude

Précambrien, glaciations, l'une vers - 2,5 à - 2 milliards d'années, une autre de - 0,8 à - 0,6 Ga. disposition des continents qui permet à la glace de s'accumuler (tectonique et climat)

Quaternaire (Pleistocène) : 2-3 MA, alternance de périodes chaudes et froides, glaciations plus longues, Dernière glaciation pris fin il ya 20 00 ans

NEOZOIQUE QUATERNAIRE

Holocène

NEOZOIQUE QUATERNAIRE

Holocène

QUATERNAIRE

Période actuelle est interglaciaire

Température moyenne au cours des 10 000 dernières années

¹⁾ Reconstruction des variations de la température moyenne au sol dans l'hémisphère nord

²⁾ Optimum: époque climatique relativement chaude

³⁾ Pessimisme: époque climatique relativement froide

BP : "before present", avant 1950

Température moyenne actuelle : 14°C ou 57°F. Moyenne faite de 1960 à 1990

PETM : maximum thermal de la période Paléocène-Eocène

Riss-Würm : période interglaciaire (-130000 à -115000ans BP)

LGM : dernier maximum glaciaire

K-T : limite Crétacé-Tertiaire

YD : "Younger Drias", brève période de retour à des températures de type période glaciaire

Données instrumentales

Proxys

Dendrochronologie

Palynologie

étude des grains de pollen dans divers matériaux accumulés

Coraux

Sédiments

Glace

Les meilleurs enregistreurs
de la variabilité
climatique

durée de vie : plusieurs
siècles

foraminifères
Les diatomées

composition isotopique
dépend des conditions
climatiques

faible δO^{18} : période froide
forte valeur : période chaude

Isotopes

Méthode/proxy	support	période couverte (années)
instrumentation		150, exceptionnellement 300
vendanges, récoltes, etc.	écrits	1 000
cernes des arbres (dendrochronologie)	arbres, arbres fossiles	10 000
pollens	sédiments lacustres, tourbières	20 000 le plus souvent mais jusqu'à plusieurs millions
dO18	glace	400 000
dO18	carbonates (foraminifères, diatomées dans les sédiments, coraux)	plusieurs millions

En Calabre, l'âge de ce platane de Curinga est estimé à plus de 1000 ans.

Foraminifères

صالح بوبنيدر
SALAH BOUBNIDER

MASTER STUDY & ECOSYSTEM BUILDING

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Merci de votre attention...

Coordinator

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

info@mastermehmed.com
www.mastermehmed.com

PROJECT NUMBER: 598826-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Partners

- D. Chakrabarty, (2019) **THE PLANETARY TURN: HISTORICAL THOUGHT IN THE ANTHROPOCENE**, Conférence à l'ENS en ligne sur [HTTPS://WWW.ENS.PSL.EU/ACTUALITES/UNE-CONFERENCE-DE-L-HISTORIEN-DIPESH-CHAKRABARTY-DECOUVRIR-SUR-SAVOIRS](https://www.ens.psl.eu/actualites/une-conference-de-l-historien-dipesh-chakrabarty-decouvrir-sur-savoirs)
- Direction de la prospective et du dialogue public, Grand Lyon (2019) **L'HUMANITÉ FACE AUX LIMITES DE LA PLANÈTE TERRE**, 11 infographies
file:///C:/Users/Afak/Downloads/Ruptures_Full%20(1).pdf
- J-C. Duplessy et P. Morel (2000) **Gros Temps sur la Planète**, Editions Odile Jacob. 338 p
- B. Francou, Chr. Vincent (2007), Les glaciers à l'épreuve du climat, IRD Editions, 274 p
- A. Foucault (2016) Climatologie et paléoclimatologie - 2e édition, *Sciences Sup, Dunod*
- Y. Fouquart (2003) **LE CLIMAT DE LA TERRE**, Presses universitaires du Septentrion, 168 p
- O'Brien et al. (2020) **The enigma of Oligocene climate and global surface temperature evolution**, Proceeding of National Academy of sciences of the united States of America (PNAS), Vol 117, n°41
- Lee Hannah et al. (2007) **Protected Area needs in a changing climate** *Frontiers in Ecology and the Environment* , 5(3):131-138 DOI: [10.1890/1540-9295\(2007\)5\[131:PANIAC\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1540-9295(2007)5[131:PANIAC]2.0.CO;2)
- Lee Hannah et al. (2002) **Conservation of Biodiversity in a Changing Climate**, *Conservation Biology* 16(1):264-268 DOI: [10.1046/j.1523-1739.2002.00465.x](https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2002.00465.x)

Coordinator

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

info@mastermehmed.com
www.mastermehmed.com

PROJECT NUMBER: 598826-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Partners

J. Labeyrie (2006) **Paléoclimats et mécanismes climatiques**, C. R. Palevol 5 (2006) 27–34, Elsevier SAS pour l'Académie des sciences.doi:10.1016/j.crvp.2005.09.015

Rockström et al. (2009) **Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity**, Ecology and Society 14(2): 32
<http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art3>

- Steffen et al.(2011) **The Anthropocene: conceptual and historical perspectives**. Phil. Trans. R. Soc. A (2011) 369, 842–867 doi:10.1098/rsta.2010.0327
<https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0327>

- UN Water (2020), **l'eau et le changement climatique**, Rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau en 2020
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unesco_rapport_mondial_des_nations_unies_sur_la_mise_en_valeur_des_ressources_en_eau_wwdr_2020.pdf

- B. Zuindeau, (2010) **DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRE**, Presses universitaires du Septentrion, 518 p.

Sites : LE QUATERNAIRE DANS LES ALPES, <https://www.glaciers-climat.com/cg/le-quaternaire-dans-les-alpes/>

<http://la.climatologie.free.fr/glaciation/glaciation2.htm>

Coordinator

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

info@mastermehmed.com
www.mastermehmed.com

PROJECT NUMBER: 598826-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Partners